

Το γλαύκωμα κλειστής γωνίας (ΓΚΓ) προκαλείται από την αδυναμία προώθησης του υδατοειδούς υγρού προς τη γωνία του πρόσθιου θαλάμου και το γωνιακό δικτυωτό. Συνήθως σχετίζεται με κορικό αποκλεισμό και τη δημιουργία πρόσθιων συνεχειών. Έχει περιγραφεί μεγάλος αριθμός παρεμβάσεων που συνεισφέρουν στη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης (ΕΟΠ) αυτών των ασθενών, όπως η λέιζερ ιριδοτομή και η φακοθρυψία (phaco). Πιο πρόσφατα έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλες επεμβάσεις συμπεριλαμβανομένης της λέιζερ ιριδοπλαστικής, της τραμπεκουλεκτομής (trab), της λύσης συνεχειών (GSL) και ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων με ποικίλα αποτελέσματα.

Λέξεις κλειδιά: Γλαύκωμα Κλειστής Γωνίας (ΓΚΓ), πρόσθιες συνέχειες, λέιζερ ιριδοτομή, φακοθρυψία, τραμπεκουλεκτομή.