

Παρουσίαση και θεραπευτική αντιμετώπιση γλαυκωματικών ασθενών που παρουσίασαν επιθηλιακά ελλείμματα κερατοειδούς μετά από χειρουργείο καταρράκτη. Τέσσερις (4) ασθενείς, χειρουργημένοι για καταρράκτη, άμεσα μετεγχειρητικά παρουσίασαν υπο-τροπιάζουσα απόπτωση επιθηλίου κερατοειδούς. Η πρώτη αντιμετώπιση ήταν επιπωματισμός με αντιβιοτική αλοιφή, χωρίς αποτέλεσμα. Σε δεύτερη φάση έγινε ενστάλαξη αναπλαστικού παράγοντα (RGTA) με κύριο συστατικό την πολύ (καρβοξυμεθυλογλυκόζη θειϊκή) με ταυτόχρονη χρήση θεραπευτικού φακού επαφής. Μετά από περίπου ένα μήνα θεραπείας σε όλα τα περιστατικά υπήρξε πλήρης αποκατάσταση του επιθηλίου του κερατοειδούς, η οποία παρέμεινε και στη συνέχεια, εκτός ενός, όπου η θεραπεία επαναλήφθηκε επιτυχώς. Η αντιμετώπιση επιθηλιακών ελλειμμάτων κερατοειδούς, τα οποία αντιστέκονταν στις συμβατικές θεραπείες, με παράγοντα RGTA είχε πολύ καλά αποτελέσματα, ανακουφίζοντας τους ασθενείς από το σοβαρό αυτό πρόβλημα.

*Λέξεις κλειδιά:* υποτροπιάζοντα έλκη κερατοειδή, φακοθρυψία, γλαύκωμα.