

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η δυστροφία κερατοειδούς του Fuchs εμφανίζεται συνήθως σε άτομα άνω των 50 ετών και χαρακτηρίζεται από προσβολή και απώλεια των ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς, πάχυνση της Δεσκεμέτειου μεμβράνης, προοδευτική άθροιση εστιακών παχύνσεων σταγονοειδούς μορφής και στρωματικό οίδημα. Προοδευτικά, η πάθηση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια όρασης και υπάρχει η ανάγκη κερατοπλαστικής. Ωστόσο, πολλοί από τους ασθενείς με δυστροφία του Fuchs λόγω της ηλικιακής κατανομής της πάθησης, εμφανίζουν ταυτόχρονα και καταρράκτη, που επίσης απαιτεί χειρουργική επέμβαση. Οι επεμβάσεις του καταρράκτη και της ενδοθηλιοπλαστικής μπορούν να συνδυαστούν σε ένα χειρουργικό χρόνο ή να πραγματοποιηθούν σε διαφορετικούς χρόνους και με διαφορετική προτεραιότητα ανάλογα με τις ενδείξεις.